

Cliëntinformatie

Rotatie osteotomie femur



Contactgegevens

Kliniek voor Bewegen Rijswijk

Braillelaan 10

2289 CM Rijswijk

✉ bewegingszorg.rijswijk@bergmanclinics.nl

www.orthopedieteam.nl

Voor telefonisch advies of het maken/wijzigen
van een afspraak,

bel het Contact & Service Center: 088 9000 500

U heeft samen met uw behandelend specialist besloten dat u geopereerd wordt. We informeren u graag over de periode waarin de operatie gepland wordt, u zich voorbereidt op de operatie en over de periode erna.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, of u wilt nog iets met ons bespreken, neem dan rechtstreeks contact op met de kliniek voor Bewegen in Rijswijk. Bij voorkeur ontvangen wij uw vraag per e-mail. Indien u teruggebeld wilt worden, kunt u dat in uw e-mail vermelden.

Inhoudsopgave

1. De operatie plannen.....	2
Preoperatieve screening (POS).....	2
Operatie planning.....	2
2. Voorbereiden op de operatie.....	3
Vooraf regelen.....	3
Roken.....	3
Eten en drinken	3
Medicijnen.....	3
Meebrengen naar de kliniek	4
3. Uw verblijf	4
Bezoek tijdens opname	4
Bewegen na de operatie	5
Operatiewond	5
Persoonlijke verzorging	5
Medicatie.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Zwelling en pijn.....	6
Overige adviezen	6
4. U bent weer thuis.....	7
Nacontrole/contactmomenten	7
Direct telefonisch contact opnemen.....	7

1. De operatie plannen

Uw behandelend specialist heeft u op de wachtlijst geplaatst. Voordat we een operatiedatum met u inplannen is het noodzakelijk dat de anesthesioloog uw medische situatie beoordeelt. Dit wordt tijdens de preoperatieve screening gedaan.

Preoperatieve screening (POS)

U ontvangt een afspraak voor de **preoperatieve screening**. Tijdens de preoperatieve screening vindt een gesprek over uw gezondheid- en een lichamelijk onderzoek plaats, eventueel aangevuld met een bloedonderzoek en/of een electrocardiogram (hartfilm).

Tijdens de preoperatieve screening ontvangt u informatie en advies met betrekking tot de mogelijke anesthesietechnieken. Voor deze operatie zijn er twee anesthesie technieken mogelijk:

- spinale anesthesie (ruggenprik) eventueel in combinatie met een sedatie (roesje)
- algehele anesthesie (narcose).

Om u goed te kunnen adviseren over uw medicatie (indien u –soms- medicatie gebruikt) hebben wij te allen tijde een **Actueel Medicatie Overzicht** van uw apotheek nodig. Dit overzicht mag maximaal 3 maanden oud zijn. U kunt deze (kosteloos) bij uw apotheek opvragen. De medicatielijst brengt u mee naar uw afspraak. Als uw medische situatie akkoord wordt bevonden, kunnen wij de operatie inplannen.

Operatie planning

De operatieplanner zoekt samen met u naar een geschikte **operatiedatum**.

De aanloop naar de operatie toe, maar ook de periode erna is een ingrijpende periode waarin we u graag goed begeleiden.

De operatieplanner stelt u daarom enkele aanvullende vragen, zodat wij u persoonlijk kunnen informeren.

Tijdens deze afspraak bespreekt de operatieplanner welke **voorbereidingen** u zelf kunt treffen. Het is belangrijk dat u na de operatie veilig kunt herstellen. U hoort welke hulpmiddelen en (tijdelijke-) aanpassingen in uw woning worden geadviseerd, welke hulp u mogelijk nodig heeft van anderen en wanneer u de opnametijd van ons hoort.

U leest er meer over in "Voorbereiden op de operatie".

2. Voorbereiden op de operatie

Uw behandelend specialist en anesthesioloog hebben uw medische situatie beoordeeld. Indien er **veranderingen in uw gezondheidstoestand** plaatsvinden, vernemen wij dat graag z.s.m. Neem daarvoor contact op met de kliniek voor Bewegen in Rijswijk.

Vooraf regelen

In de periode na de operatie heeft u mogelijk meer hulp nodig dan anders.

Boodschappen doen, koken en huishoudelijke klussen zijn deze periode lastig. Zorg ervoor dat u hier tijdig iets voor regelt.

Hulpmiddelen, zoals krukken en een douchestoel, kunt u lenen, huren of kopen bij thuiszorgwinkels. Als u de voorkeur geeft aan herstellen in een zorghotel, dan moet u dat zelf voorafgaand aan de opname regelen.

Voor deze operatie verblijft u 1 nacht in de kliniek. U dient onder **begeleiding** naar huis te reizen, omdat zelf rijden niet is toegestaan.

Roken

Roken is nadelig voor de wondgenezing en verhoogt het risico op o.a. een infectie.

Probeer om deze reden zo snel mogelijk te stoppen met roken. Wij adviseren u minstens 6 weken voor de operatie te **stoppen met roken**. Dit doet u voor uzelf, om de kans op schade aan uw gezondheid te beperken en het resultaat van de operatie te verbeteren.

Meer informatie m.b.t. het stoppen met roken kunt u vinden op onze site (www.orthopedieteam.nl) onder het kopje downloads.

Eten en drinken

U kunt alleen geopereerd worden als u **nuchter** bent. Nuchter zijn betekent dat uw maag leeg is, door een bepaalde tijd voor de opname niet te eten en/of drinken.

Vanaf 6 uur **voor opnametijd** mag u niet meer eten. Tot 2 uur **voor opnametijd** mag u alleen nog water, thee of koffie zonder melk (eventueel met suiker) drinken. U mag geen melkproducten, sappen, koolzuurhoudende dranken, kauwgom of pepermunt nuttigen.

Medicijnen

Tijdens de preoperatieve screening is met u besproken welke medicijnen u voor de operatie moet stoppen en welke medicijnen u moet blijven gebruiken. De medicatie die u door gebruikt op de ochtend van de operatie, kunt u wel innemen met een klein slokje water. Neem op de dag van de operatie uw medicijnen in de originele verpakking mee naar de kliniek.

Meebrengen naar de kliniek

- Makkelijk zittende kleding voor overdag
- Voldoende (extra) ondergoed
- Nachtkleding
- Stevige (sport) schoenen, die makkelijk te openen en te sluiten zijn
- Toiletartikelen, zoals, douchegel, shampoo, tandenborstel, tandpasta, kam, borstel
- Boeken, puzzelboekjes, e-reader, tablet, telefoon en dergelijke voor uw eigen ontspanning
- Belangrijke telefoonnummers, zoals wie zijn uw contactpersonen?
- Hulpmiddelen, zoals krukken
- Indien van toepassing: (lees-)bril, lenzen(-doosje en lenzenvloeistof), hoorapparaat
- Indien van toepassing: eigen medicatie in originele verpakking

Uw kamer beschikt over een kast met slot. Toch raden wij u aan om waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten.

3. Uw verblijf

Uiterlijk 1 dag voor uw operatie ontvangt u van ons een e-mail, waarin we de opnametijd vermelden. Hierin vindt u ook de laatste instructies.

Op de dag van uw operatie meldt zich bij de gastvrouw op de verpleegafdeling. De verpleegafdeling bevindt zich op de 2^e etage.

Als u met de auto komt, kunt u deze gratis parkeren op ons parkeerterrein.

Het team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en fysiotherapeuten (Fysio Care & Science), leveren u de zorg die u nodig heeft.

Tijdens uw verblijf informeren de verschillende zorgverleners u over uw persoonlijke situatie in de periode na de operatie. Deze adviezen zijn te allen tijde leidend.

Voor deze operatie verblijft u 1 nacht in de kliniek. De verpleegkundige stemt met u af hoe laat u opgehaald kunt worden, we streven ernaar dat dit in de ochtend na de operatie plaatsvindt tussen 10:00-12:00 uur.

Bezoek tijdens opname

De kliniek hanteert doorlopende bezoektijden. Uw bezoek is tot uiterlijk 21:00 uur welkom. Het is niet mogelijk om uw bezoek te laten overnachten. Koffie, thee en water is aanwezig in de wachtruimte.

Op de 3^e etage is ons restaurant "De Brailjant" gevestigd. U kunt hier terecht voor een kopje koffie, thee, of een lunch. "De Brailjant" is van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 16:00 uur geopend.

Bewegen na de operatie

Na de operatie bent u beperkt in het **bewegen**. Ga ervan uit dat u de eerste 6 weken krukken nodig heeft. Adviezen en oefeningen die u tijdens uw verblijf en daarna thuis zelf kunt doen, leest u terug in de folder van Fysio Care & Science. U ontvangt de folder tijdens uw verblijf van een van onze fysiotherapeuten.

Operatiewond

De operatiewond is afgedekt met een waterbestendige pleister, ook wel een douchepleister genoemd. Deze mag 5 dagen blijven zitten. Na deze 5 dagen vervangt u de douchepleister. U ontvangt deze pleisters in de kliniek.

Op de wond kunnen steristrips (zwaluwstaart pleisters) zitten, die moet u laten zitten, daaroverheen plakt u de douchepleister

Zodra u bij ons op de polikliniek voor de 2-weekse nacontrole bent geweest, is het gebruik van pleisters meestal niet meer nodig.

Als de pleister voor meer dan 2/3^e deel verzadigd is met bloed of vocht, of als de pleister losraakt, dan vervangt u deze direct.

Bij het wisselen van de pleister houdt u rekening met het volgende:

- Was de handen met water en zeep voordat u de pleister verwisselt
- Volg de instructies op het verpakkingsmateriaal van de pleister
- Raak de wond niet aan
- Maak de wond niet schoon, spoel de wond NIET uit

U krijgt een tubigrip (kous) om, draag deze 1 week. Let op: deze moet 's nachts af. We adviseren u om de eerste **4 weken** geen bodylotion of litteken crème op en rond de operatiewond te gebruiken.

Röntgenfoto

Tijdens uw verblijf in de kliniek wordt er ter controle een röntgenfoto gemaakt. De verpleegkundige brengt u naar de afdeling Radiologie.

Persoonlijke verzorging

Direct na de operatie ziet de huid rondom het geopereerde gebied er roze van kleur uit. Dit is het restant van het desinfectiemiddel die uw behandelend specialist tijdens de operatie heeft gebruikt. Het desinfectiemiddel verdwijnt vanzelf na het wassen.

U mag vanaf de eerste dag na de operatie weer **douchen**. Dit doet u alleen als u zich daar goed genoeg voor voelt. Zorg daarbij voor een veilige omgeving door een

handsteun of douchestoel te gebruiken. Zowel met de operatiepleister als de douchepleister mag u douchen.

Controleer voordat u gaat douchen of de pleister overal nog volledig aansluit op uw huid, zodat de wond niet nat wordt.

Medicatie

U krijgt voor 4 weken Fraxiparine 0,3ml 1x daags (injecties) voorgeschreven, om het risico op trombose te verminderen. Tijdens uw verblijf in de kliniek leert u van de verpleegkundige hoe u dit zelf kunt toedienen. U ontvangt tijdens uw verblijf een recept en een medicatieoverzicht. Het recept levert u in bij uw apotheek, waarna u de medicijnen ontvangt.

Zwelling en pijn

Uw been kan de eerste maanden na de ingreep gezwollen zijn (oedeem). De **zwelling** kan ter hoogte van de operatiewond plaatsvinden, maar ook verder afzakken naar uw onderbeen. Dit komt door een verstoorde bloed- en vochtregulatie in het been door de operatie. De zwelling zal 's avonds het grootst zijn en neemt af als u oefeningen doet en het been hoog legt.

Wissel activiteiten ook bij zwelling af met rust en leg het been in rust hoog. Leg daarvoor een kussen onder het matras.

Als uw been gezwollen of warm is kunt u coldpacks gebruiken, deze zijn verkrijgbaar bij de drogist of apotheek. Koel niet langer dan 15-20 min per keer, en dat mag elke 2 uur.

Na de operatie doet u het nog rustig aan. In het begin kunt u **pijn** ervaren. Meestal is de pijn aan het eind van de eerste week, zeker in rust, al fors verminderd.

Houd u aan de adviezen m.b.t. het innemen van de pijnstilling en verdeel uw activiteiten over de dag. Wissel een activiteit af met voldoende rust.

Overige adviezen

- U kunt weer **autorijden** zodra u zonder krukken pijnvrij en met een normale functie van de knie kunt bewegen, tenzij uw arts anders aangeeft.
- We adviseren u in ieder geval de eerste 2 weken hulp te vragen bij de **boodschappen** en bij diverse huishoudelijke taken.
- Wanneer u weer kunt **werken** is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Twijfelt u of u weer aan het werk kan, bespreek dit dan met uw behandelend specialist
- **Zwemmen** of een sauna bezoeken mag na 8 weken, mits de wond volledig dicht is en u stabiel op 1 been kunt staan

4. U bent weer thuis

Nacontrole/contactmomenten

1) Circa 3 dagen nadat u de kliniek heeft verlaten belt de verpleegkundige u op om te vragen hoe het met u gaat. Heeft u op een ander moment vragen aan de verpleegkundige? Stuur een e-mail naar: verpleging.bri@bergmanclinics.nl. De verpleegkundige streeft ernaar binnen een werkdag te reageren.

2) Nacontrole:

2 Weken na de operatie komt u op de polikliniek voor wondcontrole door de doktersassistente of verpleegkundige. Indien uw behandelend specialist niet-oplosbare hechtingen heeft gebruikt om de operatiewond te sluiten, worden deze verwijderd.

U ziet uw behandelend specialist tijdens deze afspraak normaal gesproken niet.

6 weken na de operatie komt u op de polikliniek. Er wordt een röntgenfoto gemaakt en u komt bij uw behandelend specialist, waarbij verder beleid met u besproken wordt.

Direct telefonisch contact opnemen

Indien u de volgende klachten heeft, neemt u direct telefonisch contact met ons op. U bereikt ons via telefoonnummer: **088-9000500**

- Bij acute zwelling, toename van pijn en roodheid op en rondom het operatiegebied
- Bij koorts hoger dan 38,5 en/of koude rillingen
- Bij ernstige wondlekkage
- Bij een dik, rood, warm, glanzend onderbeen